



Manejo
sanitario
de los
cerdos

Desde muchos años, la crianza de cerdos en patio ha sido una actividad importante de muchas familias campesinas que les genera trabajo e ingresos.

Pero, en la mayoría de los casos, se realiza sin ninguna planificación, ni uso de los métodos adecuados para asegurar la salud de los animales y la rentabilidad de la crianza.

Manejo sanitario preventivo

Para evitar que los cerdos se enfermen, se debe tomar medidas de limpieza en los chiqueros, de higiene del agua y de los alimentos.

Higiene del agua:

Por el agua, los cerdos pueden agarrar enfermedades; por eso, deben tener siempre agua limpia y los bebederos deben mantenerse limpios y desinfectados.



Higiene de los alimentos:

Hay que guardar los alimentos en lugares secos y recipientes cerrados, para que no se contaminen, por la humedad o los ratones.

Hay que lavar los comederos diario.

Higiene del chiquero:

Se debe limpiar las paredes y piso del chiquero, cada día, con una escoba y con manguera o balde de agua.

También, se puede usar desinfectante (creolina al 2% o formalina al 3%) y cal para las paredes.



Enfermedades más comunes

Cólera porcino

Es una enfermedad provocada por un virus muy contagiosa que provoca hemorragias pero, sólo en los cerdos.

Síntomas:

- ▶ Pérdida de apetito e indiferencia.
- ▶ Estreñimiento (no caga) y seguido por diarrea.
- ▶ Deshidratación.
- ▶ Temperatura alta: 42 grados.
- ▶ Tambaleo.
- ▶ Se amontonan
- ▶ Color púrpura de la piel del abdomen.
- ▶ Provoca la muerte de lechones, abortos, fetos momificados y esterilidad en la hembra.
- ▶ La enfermedad se desarrolla rápidamente (en 4 a 14 días).

Transmisión:

Se transmite por:

- ▶ Desperdicios de alimentos no cocinados.
- ▶ Aguas contaminadas.
- Introducción de cerdos ya contagiados al chiquero.
- ▶ Perros callejeros, vehículos y personas.

Prevención de la enfermedad:

- ▶ Vacunar a las 8 ó 10 semanas de edad y los cerdos en desarrollo, una vez al año.
- ▶ Las cerdas gestantes no deben ser vacunadas hasta después del parto.
- ▶ Todos los cerdos reproductores se deben revacunar cada año.

Tratamiento:

- ▶ Para esta enfermedad, no existe tratamiento.
- ▶ Hay que matar y quemar el cerdo que presenta esta enfermedad
- ▶ así como los animales que han tenido contacto con el animal enfermo.

Tetano

Es una enfermedad que se caracteriza por contracciones y endurecimiento de los músculos.

Síntomas:

- ▶ Presenta espasmo en los músculos de la cabeza.
- ▶ Tiene dificultad para recoger el alimento y masticarlo.
- ▶ Rigidez en los músculos de las patas delanteras y traseras.
- ▶ Tiene dificultad para caminar, voltearse y recular.
- ▶ Tiene fiebre y una respiración rápida.

Transmisión:

Los cerdos se pueden infestar a través del ombligo cuando este no se corta y no se desinfecta a tiempo, a través de las heridas dejadas por la castración o por usar agujas de inyectar sucias.



Prevención de la enfermedad:

- ▶ Aplicación de toxoide tetánico.
- ▶ Desinfectar los instrumentos de castración y las heridas.
- ▶ Llevar a los cerdos castrados a lugares limpios y secos.

Tratamiento:

No existe tratamiento para esta enfermedad.

Diarrea blanca

Es una enfermedad producida por una bacteria (*Echeriche Colli*) que se aprovecha de los cambios bruscos de temperatura y de lugares antihigiénicos.

Síntomas:

- ▶ Tienen una diarrea que se torna de un color amarillo o grisáceo hasta blanco.
- ▶ Los cerdos se amontonan, uno sobre otro.
- ▶ Se deshidratan.
- ▶ Tienen los ojos hundidos.
- ▶ Pierden el apetito.
- ▶ Pierden peso.
- ▶ Permanecen sucios la cola, nalgas y corvejones.

Transmisión:

Se puede transmitir por:

- ▶ Corrientes de aire.
- ▶ Mala alimentación de las cerdas.
- ▶ Consumo excesivo de leche.
- ▶ Falta de calostro.

Prevención de la enfermedad:

Los cerditos recién nacidos deben tomar el calostro de la madre.

Se deben mantener limpios el chiquero, los comederos y bebederos.

Se debe evitar las fuertes corrientes de aire, colocando sacos o sembrando árboles alrededor del chiquero.

Tratamiento:

- ▶ Inyectar el antibiótico Oxitetraciclina, por vía intra-muscular, con una dosis de 1cc por cada 10 kilogramos de peso vivo.
- ▶ O bien inyectar Trimetropin-sulfa por vía oral o intra-muscular, con una dosis de 1cc por cada 30 kilogramos de peso vivo, durante 5 días.



Neumonía

Es una enfermedad que ocasiona retraso en el crecimiento del cerdo y un bajo rendimiento de carne lo que provoca enormes pérdidas de dinero.

Síntomas:

- ▶ Ocurre entre las 3 y 10 semanas de edad.
- ▶ Diarrea
- ▶ Tos
- ▶ Respiración como de un perro cansado
- ▶ Disminución del apetito y pérdida de peso.

Transmisión:

- ▶ Por el aire.
- ▶ A través de la madre.
- ▶ Por contacto directo con otros animales enfermos.

Prevención y control:

- ▶ Mantener limpios los lugares y animales.
- ▶ Separar los animales enfermos de los sanos.
- ▶ Evitar las fuertes corrientes de aire.

Tratamiento:

▶ Tilosina

Dosis de 12 miligramos por kilogramo de peso de vivo, cada 12 horas hasta que el animal se recupere.

▶ Lincomisina

33 miligramos por litro de agua, cada 24 horas.

▶ Trimetropin Sulfá

Dosis de 1cc por cada 30 kilogramos de peso vivo, por vía intra-muscular, durante 5 días.

Erisipela o mal rojo

Esta enfermedad es causada por una bacteria.

También, se puede transmitir al hombre.

Síntomas:

- ▶ Manchas rojas en el vientre.
- ▶ Manchas rojas en las orejas y cuello.
- ▶ Tiene temperatura alta de 43 grados centígrados.
- ▶ Camina renco.
- ▶ Está triste.
- ▶ La muerte ocurre dentro de las 24 horas.
- ▶ El cerdo enfermo se separa de la camada.

Transmisión:

- ▶ Por contacto directo de un animal a otro.
- ▶ Por lugares contaminados.

Prevención de la enfermedad:

Vacunación a las 8 semanas de edad o a los 10 días después del destete.


Vacunación de los cerditos en lactancia, si existe la enfermedad en algunas fincas vecinas.

Revacunar de 10 a 14 días después del destete.

Las marranas y cerdas primerizas deben vacunarse 30 días antes del parto o por lo menos, cada 6 meses, al igual que los verracos.

Tratamiento:

- ▶ Suero de disípela con penicilina.
- ▶ Dosis de 2cc por animal de todas las edades.



Leptospirosis

Es una enfermedad causada por un microbio que puede pasarse al hombre.

Síntomas:

- ▶ Aborto dentro de las 3 semanas antes de parir.
- ▶ Nacimientos de lechones débiles o muertos.
- ▶ Fiebre.
- ▶ Pérdida de apetito.
- ▶ Disminución de peso.

Transmisión:

- ▶ A través de la orina.
- ▶ Contacto sexual con el macho.
- ▶ Contacto directo de un animal enfermo a otro sano.
- ▶ A través de las corrientes de agua.
- ▶ Por el contacto con vacas enfermas.

Prevención de la enfermedad:

- ▶ Vacunación.
- ▶ Todo animal recién comprado debe ser aislado y observado.
- ▶ Evitar el consumo de agua sucia.
- ▶ Lavar y fregar muy bien las instalaciones donde las hembras paren.
- ▶ Control de ratas y ratones en la finca.

Tratamiento:

No existe cura para esa enfermedad.



Parásitos internos (lombrices)

Los parásitos internos se encuentran en casi todas las partes del aparato digestivo, en las vísceras (hígado, riñones, pulmones) y músculos.

Síntomas:

- ▶ Diarrea.
- ▶ Debilidad.
- ▶ Pérdida de peso.
- ▶ Animal flaco y barriga grande y caída.
- ▶ Pelo grueso y chirizo
- ▶ Manchas de sangre en las cagadas
- ▶ Orina con pus.
- ▶ Atraso en el crecimiento.
- ▶ Problemas para respirar y tos seca.

Transmisión:

- ▶ Contacto con animales que han cagado huevos de parásitos.
- ▶ Comida y agua contaminada.
- ▶ Cuando se sueltan y escarban el suelo.
- ▶ Cerdos que comen mierda.

Prevención:

Poner trompillas a todos los cerdos para que no escarben la tierra.

Construcción de letrinas para que la gente no siga cagando en el monte.

Separar los animales con parásitos.

Realizar desparasitación cada 3 meses.

Tratamiento:

- ▶ Albendazol vía oral.
Dosis de 1 sobre de 10 gramos para 10 cerditos. Un sobre de 10 gramos para 2 cerdos en desarrollo o adultos.
- ▶ Ivermectina vía sub-cutánea.
Dosis de 1cc para 100 libras de peso.
- ▶ Levamizol vía intra-muscular.
Dosis de 1cc por cada 40 libras de peso.
- ▶ Mebendazol vía oral.
Una pastilla por cada 20 libras de peso.



Parásitos externos (piojos, garrapatas, pulgas y sarna)

Son enfermedades de la piel que afectan la salud del animal.

Síntomas:

- ▶ Disminución del crecimiento, tanto en lechones como en cerdos jóvenes.
- ▶ Anemia.
- ▶ Piel reseca alrededor del hocico, orejas, patas, ojos y pescuezo.
- ▶ Animal inquieto y desesperado.
- ▶ Se rasca en los palos o paredes de la casa.
- ▶ Coloración de la piel.
- ▶ Piel escamosa o con una especie de caspa.

Transmisión:

- ▶ Contacto directo de un animal a otro.
- ▶ Chiquero y camas infectados.

Prevención:

- ▶ Bañar a los animales cada 21 días.
- ▶ Fumigar paredes, pilares, comederos, bebederos, así como los lugares donde los cerdos se mantienen echados.

Tratamiento:

- ▶ Bañar a los cerdos con:
Nuvan: Dosis de 1.5 cc en un litro de agua, cada 21 días.
- ▶ Fumigar el chiquero con:
Butox: 1 cc en un litro de agua, cada 21 días.



